

# Nova

LABORATORIES

EXCEL IN LIFE SCIENCES

کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول

## Coxisol 24%

### Oral Solution

**Coxisol 24%** Treats Caecal & Intestinal Coccidiosis In Breeders, Layers & Broilers.

**Coxisol 24%** Treats, fowl Cholera and typhoid

**Coxisol 24%** Provides Fast, Reliable, Safe & Effective Treatment.

**Coxisol 24%** Is Economical And Reverts Economic Losses.

کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول سے جب خونی پچیش (کاکسی ڈی اوسس) کا علاج کیا جاتا ہے تو مرض خطرناک نہیں رہتا۔

# Coxisol 24% Oral Solution

Coccidiosis is of major economic importance in the poultry industry. The principal enteric coccidia effecting animals are eimeria or isospora spp. The protozoa invade the gut where their development damages the intestinal mucosa causing diarrhoea.

Coccidiosis which spreads through internal parasites (eimerias), is a fatal disease among poultry birds. Serious economic losses are also associated with mild disease outbreaks, either through a reduced weight gain or through a persistent decline in egg production. The causal agents of coccidiosis are microscopically small, single celled parasites which damage specific sections of the intestine and caecum. The infection results exclusively from ingestion of affected particles of faeces from the litter, feed or water. Within a few days the parasites multiply rapidly and the whole section of intestine becomes seriously damaged. Treatment of the infected flock should be started as soon as possible after diagnosis or better still - immediately there is even only a suspicion of coccidiosis, in order that any further spreading of the disease might be checked. For birds showing very severe clinical symptoms, treatment may well be already too late because the pathogen is susceptible to therapeutants only during its first phase of development in the host animal (schizogony = asexual reproduction) i.e. From about the second until the fifth day after infection.

## ACTIVE INGREDIENTS

Each ml contains:

Sulphaquinoxaline..... 200.0 mg  
Trimethoprim ..... 40.0 mg

## INDICATION

For the treatment and prevention of caecal and intestinal poultry coccidiosis, Fowl Cholera and Typhoid.

### Poultry

- ★ Caecal coccidiosis (Eimeria tenella)
- ★ Intestinal coccidiosis (other Eimeria)
- ★ Mixed coccidial-bacterial infections
- ★ Fowl Cholera & Typhoid
- ★ Enteritis

## DOSAGE AND ADMINISTRATION

### POULTRY COCCIDIOSIS

The oral dosage for sulphaquinoxaline and trimethoprim is 30 mg active ingredients per kg body weight per day.

### PREVENTION REGIME

0.25 ml of Coxisol 24% solution to 1 Liter of drinking water for 3 - 4 days.

### TREATMENT REGIME

Administer by oral route 1 ml of Coxisol 24% solution to 2 Liter of drinking water.

Medicated for three days and discontinue the treatment for two days, and then repeat medicated at same dosage for another two days.

To prevent precipitation of the solution due to different quality of water, always add the required dose of this solution direct to the water tank and stir well. Do not prepare any intermediate solution.

## PRECAUTIONS

- ★ Keep out of reach of children.
- ★ Store at room temperature.

## WITHDRAWAL PERIOD Meat: 5 days

**Packing** 250 ml & 1 Liter

# کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول

کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول میں فی ملی لیٹر شامل ہے۔

سلفا کیو کسائلین ..... 200.0 ملی گرام  
ٹری مپتھوپریم ..... 40.0 ملی گرام

اجزائے ترکیبی

خصوصیات

- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول مرغیوں کے مہلک امراض خاص طور پر تھائریڈائٹس کی خونی نچھڑ کے علاج کے لئے بہترین دوا ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول کے استعمال سے شرح اموات میں کمی سے کی ہو جاتی ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول آنتوں کی سوزش کا تیز بہدفع علاج ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول پلورم اور فاؤل ٹائپھیڈائٹس میں انتہائی موثر ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول سرجی الاثر ہے اور استعمال کے فوراً بعد بیماری سے اثر کرتی ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول کے استعمال سے مرغیاں جلد صحت یاب ہو جاتی ہیں۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول کے استعمال سے مرناس میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول ہر قسم اور ہر عمر کے چمزدوں میں بلا خوف و خطر استعمال کی جاتی ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول بریڈر، لیمبر اور برائٹنر میں سیکل اور آنتوں کی خونی نچھڑ کا موثر علاج ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول متاثرہ مرغیوں کی پیداواری صلاحیت کو بحال کر کے دوہرے نقصان سے بچاتی ہے۔
- کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول مناسب قیمت میں قابل اعتماد دوا جو بہترین نتائج دے کر کاروبار کو منافع بخش بناتی ہے۔

## خوراک اور طریقہ استعمال

بیماری سے بچاؤ کیلئے

1 ملی لیٹر کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول 4 لیٹر پانی میں اچھی طرح حل کر کے تین سے چار دن مرغیوں میں استعمال کرائیں۔

بیماری کی حالت میں

1 ملی لیٹر کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول 2 لیٹر پانی میں اچھی طرح حل کر کے تین دن مرغیوں میں استعمال کریں۔ پھر دو دن کا وقفہ ڈال کر کاکسی سول ۲۴ فیصد محلول کو اسی مقدار میں دو دن اور استعمال کریں۔

احتیاط

- ★ کمرہ کے درجہ حرارت پر رکھیں۔
- ★ یہ انسانوں کے استعمال کیلئے نہیں ہے۔
- ★ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

اور 1 لیٹر میں دستیاب ہے۔

250 ملی لیٹر،

پیکنگ

Exclusive Distributor in Pakistan:

**MUSTAFA BROTHERS**

Faisalabad Office:

186-D, Peoples Colony No. 1, Faisalabad.

TEL: + 92- 41- 8724059

FAX: + 92- 41- 8722059

Email: colmustafa2000@yahoo.com



**MUSTAFA BROTHERS**

DEALS IN VETERINARY PHARMACEUTICALS  
AND FEED PREMIXES

Manufactured by:

**Nova Laboratories Sdn. Bhd.**

Lot 708, Nova Avenue, 4th Mile, 43950 Sg.

Pelek, Selangor, Malaysia.